



Município de Farol

Secretaria de Saúde

GRUPOS PRIORITÁRIOS	ESTIMATIVA	1º D	2º D	3º D	D.UNICA	REF.
Pessoas de 60 anos ou mais, institucionalizadas	00	00	00		00	
População Indígena em Terras Indígenas D.	00	00	00		00	
Trabalhadores de Saúde que atuem em serviços de saúde	81	81	81	75	0	
Pessoas de 80 anos ou mais	92	92	91	84	01	
Pessoas de 75 a 79 anos	83	85	84	79	00	
Pessoas de 70 a 74 anos	109	109	103	102	00	
Pessoas de 65 a 69 anos	147	146	145	139	00	
Pessoas de 60 a 64 anos	197	196	194	159	00	
Pessoas com Comorbidades de 18 a 59 anos	490	501	495	337	00	
Trabalhadores Educação e da Assistência Social	60	60	60	45	00	
Gestante e puérperas de 18 a 59 anos	10	15	15	03	00	
Trabalhadores da limpeza coletiva urbana	09	09	09	04	00	
Bancários	03	03	03	03	00	
Caminhoneiros	45	29	28	09	10	05
POPULAÇÃO EM GERAL DOS 59 AOS 18 ANOS						
Pessoas de 59 A 44 anos	400	438	423	206	29	24
Pessoas de 43 A 40 anos	50	35	32	20	0	
Pessoas de 39 A 36 anos	182	109	106	45	00	
Pessoas de 35 A 30 anos	200	167	159	52	00	
Pessoas de 29 A 25 anos	300	186	182	52	00	
Pessoas de 24 A 18 Anos	200	206	190	28	00	
ADOLESCENTES JOVENS DE 17 A 12 ANOS						
Pessoas de 12 á 17 anos	316	293	265	00	00	
FASE VIGENTE CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS						
Pessoas de 05 a 11 anos	371	217	76	00	00	00
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento	00	00	00	00	00	
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas	00	00	00	00	00	
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas	00	00	00	00	00	
Trabalhadores de Transp. Coletivo Rod. e Fer.de Pas.	00	00	00	00	00	
Trabalhadores de Transporte Aéreo	00	00	00	00	00	
Trabalhadores Portuários	00	00	00	00	00	
População Privada de Liberdade	00			00	00	
Trabalhadores do Sistema Prisional	00	00	00	00	00	
Pessoas em Situação de Rua	00	00	00	00	00	
TOTAL DA POPULAÇÃO ESTIMADA	3.345	2.971	2.670	1.311	40	17

GRUPO PRIORITARIO PARA QUARTA DOSE

O Plano Nacional de Imunização (PNI) considera imunossuprimidos como:



Município de Farol

Secretaria de Saúde

Portadores de imunodeficiência primária grave;	Portadores de imunodeficiência primária grave;
Pacientes em quimioterapia;	Pacientes em quimioterapia;
Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)	Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)
Usuários de drogas imunossupressoras;	Usuários de drogas imunossupressoras;
Pessoas vivendo com HIV/AIDS;	Pessoas vivendo com HIV/AIDS;
Pacientes em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias;	Pacientes em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias;
Pessoas que usam drogas modificadoras da resposta imune;	Pessoas que usam drogas modificadoras da resposta imune;
Pacientes com condições auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias;	Pacientes com condições auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias;
Pacientes em hemodiálise;	Pacientes em hemodiálise;
Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.	Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.
*Esse artigo foi revisado pela equipe médica da PEBMED	*Esse artigo foi revisado pela equipe médica da PEBMED

Fonte : Sistema IDS/SI-PNI

Atualizado em: 07/03/2022